

ERN GENTURIS Santrauka paprasta kalba: *Vėžio priežiūros gairės asmenims, sergantiems PTEN hamartomos naviko sindromu (PHTS)*

ĮVADAS

PTEN hamartomos naviko sindromą (PHTS) sukelia PTEN (fosfatazės ir tenzino homologo) geno pokytis. PHTS padidina krūties, skydliaukės, endometriumo, inkstų ir storosios žarnos vėžio riziką. PHTS yra retas ir yra diagnozuojamas atliekant genetinius tyrimus. Laikoma, kad patikra ir stebėseną yra labai svarbi norint nustatyti ankstyvą vėžį ir efektyviai gydyti žmones.

GAIRĖS TIKSLAI

PTEN hamartomos naviko sindromo (PHTS) gairės buvo sukurtos siekiant padėti sveikatos priežiūros specialistams atlikti naujausią PHTS sergančių asmenų priežiūrą. Šios gairės buvo parengtos remiantis geriausiais turimais įrodymais ir ekspertų, slaugančių PHTS, sutarimu ir reguliariai atnaujinamos, kad atspindėtų įrodymų pokyčius. Tikimasi, kad gydytojai laikysis šių gairių, nebent yra įtikinamų klinikinių priežasčių, dėl kurių konkrečiam pacientui jos nesilaikoma.

GAIRĖS TAIKYMO SRITIS IR TIKSLAS

Gairės skirtos PHTS sergančių asmenų vėžio patikrai ir stebėsenai. Kiekvienai vėžio rūšiai gairėse nurodoma, koks tyrimas turėtų būti naudojamas stebėsenai, kokio amžiaus pradėti stebėjimą ir kaip dažnai tyrimus kartoti.

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS

	Koks testas	Kaip dažnai	Pradedant nuo
Skydliaukės vėžys	Ultragarsas	Kiekvienais metais	18 metų
Krūties vėžys	MRT Mamografija	Kiekvienais metais Kas 2 metus	30 metų
Inkstų vėžys	Ultragarsas	Kas 2 metus	40 metų
Endometriumo vėžys	Nerekomenduojama	*jei patikrinta, tada: Ultragarsas: kasmet	(40)*
Storosios žarnos vėžys	Laikykites bendrosios atrankinės patikros gairių	-	-

Be pirmiau išvardytų testų, gairėse rekomenduojama, kad sergančioms moterims būtų pasiūlyta riziką mažinanti krūtų operacija.

Atsakomybės apribojimas: šios santraukos turinys pagrįstas "GENTURIS Cancer surveillance guideline for individuals with PTEN Version 14 (05.09.2019)".