

PHTS gairių santrauka

Šios gairės buvo parengtos remiantis geriausiais turimais įrodymais ir šios srities ekspertų sutarimu ir yra reguliariai atnaujinamos, kad atspindėtų įrodymų pokyčius.

Tikimasi, kad gydytojai laikysis šių gairių, nebent yra įtikinamų klinikinių priežasčių, dėl kurių konkrečiam pacientui jos nesilaikoma.



European
Reference
Network

for rare or low prevalence
complex diseases

 Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu

	Priežiūra	Intervalas	Nuo Amžiaus	Įrodymai
Krūties vėžys	MRT	Kasmet	30	Stiprus
	Mamografija	Kas 2 metus	40	Vidutinis
	Siūloma riziką mažinanti operacija	-	-	Vidutinis
Skyd liaukės vėžys	Ultragarsas	Kasmet	18*	Stiprus
Inkstų vėžys	Ultragarsas	Kas 2 metus	40	Vidutinis
Storosios žarnos vėžys	Bazinė kolonoskopija	-	35-40	Vidutinis
Melanoma	Bazinis odos tyrimas**	-	30	Silpnas
Endometriumo vėžys***	Nerekomenduojama	-	-	Silpnas

* Vidutinis stebėjimo pradžios amžius. ** Jei reikia, apsvastykite tolesnę priežiūrą. ***Stebėjimą svarstykite kaip klinikinio tyrimo dalį.

Vėžio priežiūros gairės

asmenims, sergantiems PTEN hamartomos naviko sindromu (PHTS).

Šios gairės buvo parengtos remiantis geriausiais turimais įrodymais ir šios srities ekspertų sutarimu ir yra reguliariai atnaujinamos, kad atspindėtų įrodymų pokyčius.

Tikimasi, kad gydytojai laikysis šių gairių, nebent yra įtikinamų klinikinių priežasčių, dėl kurių konkrečiam pacientui jos nesilaikoma.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu