

PHTS vadlīniju kopsavilkums


Šīs vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem pierādījumiem un ekspertu pieredzi šajā jomā, un tās regulāri atjaunina, lai atspoguļotu pierādījumu izmaiņas.

Paredzams, ka klīnicisti ievēros šīs vadlīnijas, ja vien konkrētām pacientam nav pārliecinošu klīnisku iemeslu, lai to nedarītu.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu

	Novērošana	Intervāls	No vecuma	Pierādījumi
Krūts vēzis	MRI	Katru gadu	30	Spēcīgs
	Mammogrāfija	Ik pēc 2 gadiem	40	Mērens
	Piedāvāta riska samazināšanas operācija	-	-	Mērens
Vairogdziedzera vēzis	Ultrasonogrāfija	Katru gadu	18*	Spēcīgs
Nieru vēzis	Ultrasonogrāfija	Ik pēc 2 gadiem	40	Mērens
Kolorektālais vēzis	Sākotnējā kolonoskopija	-	35-40	Mērens
Melanoma	Sākotnējā ādas pārbaude**	-	30	Vāja
Endometrija vēzis***	Nav ieteicams	-	-	Vāja

* Vidēji pierādījumi par novērošanas uzsākšanas vecumu. ** Ja nepieciešams, apsveriet papildu novērošanu. *** Apsveriet novērošanu kā daļu no klīniskās izpētes.

Vēža novērošanas vadlīnijas

personām ar PTEN hamartomas audzēja sindromu (PHTS).

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem pierādījumiem un ekspertu pieredzi šajā jomā, un tās regulāri atjaunina, lai atspoguļotu pierādījumu izmaiņas.

Paredzams, ka kliniķi ievēros šīs vadlīnijas, ja vien konkrētam pacientam nav pārliecinošu klīnisku iemeslu, lai to nedarītu.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu