

Resumo da diretriz PHTS

Esta diretriz foi elaborada a partir das melhores evidências disponíveis e do consenso de especialistas nesta área e é atualizada regularmente para refletir as mudanças nas evidências.

A expectativa é que os médicos sigam esta diretriz, a menos que haja uma razão clínica convincente específica para um paciente individual não o fazer.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu

	Vigilância	Intervalo	Da idade	Evidência
Cancro de mama	Ressonância magnética	Anual	30	Forte
	Mamografia	A cada 2 anos	40	Moderado
	Cirurgia de redução de risco oferecida	-	-	Moderado
Cancro de tireoide	Ultrassom	Anual	18*	Forte
Cancro renal	Ultrassom	A cada 2 anos	40	Moderado
Cancro colorretal	Colonoscopia de linha de base	-	35-40	Moderado
Melanoma	Exame de base da pele**	-	30	Fraco
Cancro do endométrio***	Não recomendado	-	-	Fraco

* Evidência moderada para idade de início da vigilância. ** Considere mais vigilância conforme necessário. *** Considere a vigilância como parte do ensaio clínico.

Diretrizes de Vigilância do Cancro

Diretriz de vigilância do cancro para indivíduos com síndrome do tumor de hamartoma PTEN (PHTS).

Esta diretriz foi elaborada a partir das melhores evidências disponíveis e do consenso de especialistas nesta área e é atualizada regularmente para refletir as mudanças nas evidências.

A expectativa é que os médicos sigam esta diretriz, a menos que haja uma razão clínica convincente específica para um paciente individual não o fazer.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu