

Protocollo di sorveglianza per la schwannomatosi

	Esame	Intervallo	Età d'inizio	Forza della raccomandazione*
Schwannomatosi	Esame clinico, valutazione del dolore ed esame neurologico	Annuale	12-14 anni	Moderata
Schwannomi	Risonanza magnetica dell'encefalo e della colonna vertebrale	Secondo specifiche raccomandazioni per gene/classi di età	Alla diagnosi o a 12-14 anni	Forte
	Risonanza magnetica total body	Baseline o subito dopo. Considerare alternanza con risonanza magnetica encefalo-spinale	Alla diagnosi o a 12-14 anni	Moderata
	Ecografia	Da considerare per la valutazione di problemi a livello degli arti o in regioni intercostali	In base alla sintomatologia	Moderata

* Questa classificazione si basa su dati di articoli di letteratura scientifica e sul consenso di esperti: forte – consenso di esperti E dati scientifici concordanti; moderata – consenso di esperti CON dati non concordanti E/O nuove evidenze che probabilmente supportano la validità della raccomandazione; debole – decisione a maggioranza di esperti SENZA dati concordanti

Protocollo di sorveglianza per la schwannomatosi

Queste linee guida sono state redatte sulla base delle migliori evidenze disponibili e del consenso di esperti del settore, e vengono regolarmente aggiornate alla luce di nuove acquisizioni scientifiche.

Ci si attende che i medici seguano queste linee guida, a meno che non vi siano motivazioni cliniche convincenti che inducano a fare altrimenti per singoli casi specifici.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu