

PRIPOROČILA ZA SPREMLJANJE POSAMEZNIKOV S ŠVANOMATOZO

	Presejanje/zgodnje odkrivanje švanomov	Časovni interval spremljanja	Začetek spremljanja	Moč dokazov*
Švanomatoza	Klinični pregled in ocena prisotnosti bolečine ter klinični nevrološki pregled	1-krat letno	12-14 let	Zmerna
Švanomi	MRI preiskava možganov in hrbtenice	Glede na ugotovljeno okvaro v genu, ki je vzročno povezan s švanomatozo/ glede na starostna priporočila	Ob postavitvi diagnoze ali v starosti 12-14 let	Močna
	MRI preiskava celotnega telesa	Ob postavitvi diagnoze, nato razmislek o zamenjavi za MRI preiskavo možganov in hrbtenice	Ob postavitvi diagnoze ali v starosti 12-14 let	Zmerna
	Ultrazvočna preiskava	Diagnostika sprememb prisotnih na okončinah in v medrebrnih prostorih	Glede na klinično sliko	Zmerna

* Moč dokazov temelji na dokazih pridobljenih iz strokovne literature in priporočilih strokovnjakov: močna – priporočila strokovnjakov IN nedvoumni dokazi pridobljeni iz znanstvene literature, zmerna – priporočila strokovnjakov na podlagi nedoslednih dokazov pridobljenih iz znanstvene literature IN/ALI novih dokazov pridobljenih iz znanstvene literature, ki bi verjetno podprli priporočilo, šibka – odločitev na podlagi priporočil strokovnjakov BREZ nedvoumnih dokazov iz znanstvene literature

PRIPOROČILA ZA SPREMLJANJE POSAMEZNIKOV S ŠVANOMATOZO

Priporočila za spremljanje posameznikov s švanomatozo temeljijo na najnovejših razpoložljivih dokazih iz znanstvene literature in priporočilih strokovnjakov ter se skladno z novostmi na področju švanomatoz redno posodablja.

Zdravnik specialist naj upošteva priporočila za spremljanje bolnikov s švanomatozami, razen v primeru, ko klinični potek bolezni posameznika zahteva individualno prilagoditev programa spremljanja.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu