

ERN GENTURIS - Souhrn:

Doporučení pro sledování osob s PTEN hamartomatosním syndromem PTEN (PHTS)

ÚVOD

PTEN hamartomatosní nádorový syndrom (PHTS) je způsoben změnou genu PTEN (fosfatázový a tensinový homolog). U PHTS se zvyšují rizika nádorů prsu, štítné žlázy, endometria, ledvin a kolorektálního karcinomu. PHTS je vzácný syndrom a jeho diagnóza závisí na genetickém testování. Pravidelné sledování je považováno za zásadní pro časné odhalení nádorů a lepší možnosti léčby.

CÍLE DOPORUČENÍ

Doporučení pro PTEN hamartomatosní nádorový syndrom (PHTS) byla vytvořena, aby pomohla zdravotnickým pracovníkům poskytovat nejaktuálnější péči o jednotlivci s PHTS. Tento pokyn byl čerpán z nejlepších dostupných důkazů a konsensu odborníků v péči o osoby s PHTS a je pravidelně aktualizován, aby odrážel změny v důkazech. Očekává se, že kliničtí lékaři se budou tímto doporučením řídit, pokud neexistuje přesvědčivý klinický důvod specifický pro jednotlivého pacienta.

ROZSAH A ÚČEL DOPORUČENÍ

Doporučení je určeno pro sledování nádorů u jedinců s PHTS. Pro každý typ nádoru doporučení uvádí, jaký test by měl být použit pro sledování, v jakém věku začít sledování a jak často opakovat vyšetření.

KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ

	Vyšetření	Jak často	Začátek od
Nádor štítné žlázy	Ultrazvuk	Každý rok	18 let
Nádor prsu	MRI Mamografie	Každý rok Každé 2 roky	30 let
Nádor ledvin	Ultrazvuk	Každé 2 roky	40 let
Nádor endometria	Nedoporučeno	*při screeningu: Ultrazvuk: ročně	(40)*
Nádor kolorekta	Dodržujte obecné pokyny pro screening populace	-	-

Kromě výše uvedených testů doporučení doporučuje, aby postiženým ženám byla nabídnuta preventivní operace prsu snižující riziko.

Prohlášení: Obsah tohoto shrnutí je založen na "GENTURIS Cancer surveillance guideline for individuals with PTEN Version 14 (05.09.2019)".