

## Protocolo de Vigilância Schwannomatose

	Exame ou vigilância	Intervalo	Idade para começar	Força*
Schwannomatose	Exame clínico e avaliação de dor e exame neurológico	Anual	12-14 anos	Moderado
Schwannomas	Ressonância magnética (RM) do cérebro e da coluna	De acordo com recomendações específicas de gene/idade	Diagnóstico ou 12-14 anos	Forte
	RM de corpo inteiro	Ao diagnóstico ou logo depois. Considere alternar com Cranio-espal-	Diagnóstico ou 12-14 anos	Moderado
	Ultrassom	Considerar para resolução de problemas em membros ou intercostais	A l'apparition de signe clinique	Moderado

\* Esta classificação é baseada em artigos publicados e consenso de especialistas: forte – consenso de especialistas E evidências consistentes, moderado – consenso de especialistas COM evidências inconsistentes E/OU novas evidências que provavelmente apoiarão a recomendação, fraca – decisão da maioria dos especialistas SEM evidências consistentes

# Protocolo de Vigilância

Schwannomatose

Esta diretriz foi elaborada a partir das melhores evidências disponíveis e do consenso de especialistas nesta área e é atualizada regularmente para refletir as mudanças nas evidências.

A expectativa é que os médicos sigam esta diretriz, a menos que haja uma razão clínica convincente específica para um paciente individual não o fazer.



**European  
Reference  
Network**

for rare or low prevalence  
complex diseases



Genetic Tumour Risk  
Syndromes (ERN GENTURIS)



[www.genturis.eu](http://www.genturis.eu)