

ERN GENTURIS Sommarju tal-Lingwa Sempliċi:

LINJI GWIDA TA' PRATTIKA KLINIKA GHAD-DJANJOŽI, TRATTAMENT, GESTJONI U SORVELJANZA TA' PERSUNI BI SCHWANNOMATOSI

INTRODUZZJONI

Schwannomatosis hija kkaratterizzata mill-iżvilupp ta 'tumuri tal-kisi tan-nervituri tipikament bl-uġiġ u beninni (schwannomas) fuq in-nervituri spinali u periferali madwar il-ġisem. Il-kura klinika għal nies bi schwannomatosis tvarja sostanzjalment, peress li għad m'hemm l-ebda linja gwida specifika dwar schwannomatosis.

LINJA GWIDA GHANJIET

Il-linjal-għida schwannomatosis inħolqot biex tassisti lill-professjonisti tal-kura tas-saħħha biex jagħtu l-aktar dijanjosi aġġornata, gestjoni klinika u sorveljanza ta 'nies bi schwannomatosis. Din il-linjal-għida ġiet meħuda mill-aħjar evidenza disponibbli u l-qbil ta 'esperti fil-kura ta' nies bi schwannomatosis u se tigi aġġornata regolarmen biex tirrifletti bidliet fl-evidenza. L-istennija hija li l-klinċisti jsegu din il-linjal-għida sakemm ma jkunx hemm raġuni klinika konvinċenti specifika għal pazjent individwali li ma tagħml ix-dan.

AMBITU U GHANT AL-LINJA GWIDA

Il-linjal-għida hija maħsuba biex tiddefinixxi l-aħjar dijanjosi, gestjoni klinika u sorveljanza ta 'nies bi schwannomatosis.

PROTOKOLL TA'SORVELKANZA: SCHWANNOMATOSIS

Eżami jew sorveljanza	Intervall	Età biex tibda	Qawwa*	
Schwannomatosis	Eżami kliniku u valutazzjoni għall-ugħiġ u eżami newroloġiku	Ta 'kull sena	12-14-il sena	Moderat
Schwannomas	MRI tal-moħħ u tas-sinsla	Skont ir-rakkomandazzjonijiet	Dijanjosi jew 12-14-il sena	Qawwija

Čaħda ta' responsabbiltà: Il-kontenut ta' dan is-sommarju huwa bbażat fuq il ERN GENTURIS CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS, TREATMENT, MANAGEMENT AND SURVEILLANCE OF PEOPLE WITH SCHWANNOMATOSIS Version 8.3 (22.07.2021)

		speċifici minhabba ġeni/età		
	MRI tal-ġisem kollu	Linja baži jew ftit wara. Ikkunsidra li talterna ma' Craniospinal-	Dijanjos i jew 12-14-il sena	Moderat
	Ultrasound	Ikkunsidra għas-soluzzjoni tal-problemi fir-riġlejn jew interkostatali-	Kif xieraq	Moderat

* Din il-gradazzjoni hija bbażata fuq artikli ppubblikati u qbil espert.

RAKKOMANDAZZJONIJIET EWLENIN

Ħarsa ġenerali klinika	L-istennija tal-ħajja fi schwannomatosis normalment mhix affettwata, b'differenza NF2. L-uġigħi huwa karakteristika prominenti, speċjalment għal nies b'varjant patoġeniku tal-linjal ġerminali <i>LZTR1</i> .
Dijanjosi	F'nies bi schwannomatosis fl-età riproduttiva jew fi tranzizzjoni, għandha ssir diskussjoni dwar ir-riskji probabbli ta' trażmissjoni lilit-tfal u l-għażiex fit-tqala u d-dijanjosi ta' qabel l-impjantazzjoni.
Immaġini	F'pazjenti b'uġigħi lokalizzat u/jew deficit fokali newroloġiku assoċjat, mingħajr schwannoma ovju MRI lokalizzat għandu jsir bl-użu ta' flieli rqaq (<3mm) sabiex jinstabu schwannomas żgħar ħafna iżda funzjonalment sinifikanti.
	Għal investigazzjoni mmirata tal-uġigħi, l-ultrasound (f'idejn xi ħadd b'esperjenza fl-immaġini ta'schwannomas) jista' jkun mod utli għas-soluzzjoni tal-problemi.

Valutazzjoni klinika annwali	<p>F'kull żjara ta' reviżjoni għandu jkun hemm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazzjoni sħiħa tal-istorja tal-uġiġħ • Eżami newroloġiku sħiħ • Valutazzjoni tal-Kwalità tal-Ħajja bl-użu ta' għoddha rikonoxxuta eż. EQ-5D • Valutazzjoni tal-ħtiġijiet psikoloġiči tal-pazjent
Gestjoni tal-uġiġħ mhux kirurġiku	<p>Għandu jintuża ġestjoni tal-uġiġħ b'mod multidixxiplinarja li tiffoka fuq il-ġestjoni tas-sintomi u li timmira diżabilità relatata mal-uġiġħ bl-użu ta' approċċ bijo-psikosoċjali.</p>
	<p>Schwannomas bl-uġiġħ għandhom komponent newropatiku sinifikanti, mediċini bħal antidipressanti triċċikliċi u gabapentinoids għandhom jintużaw l-ewwel linja, u SSRI jew ASD ieħor (Topiramate, Carbamazepine, Oxcarbazepine) it-tieni linja.</p>
Intervent kirurġiku	<p>Xi leżjonijiet ma jistgħux jitneħħew kirurġikament, u l-operazzjonijiet huma marbuta ma 'morbožitā akbar. Għalhekk, il-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' suċċess u r-riskji ta' deficit newroloġiku għandha tħalli valutazzjoni minn kirurgu b'esperjenza sinifikanti li jirresek tumuri tal-ġħant tan-nervituri</p>

HTIĞIJIET PSIKOLOGIČI

Filwaqt li l-manifestazzjonijiet fiziċi ta' 'schwannomatosis huma oġġettivi u deskrittibbli, huwa importanti li jiġi kkunsidrat l-impatt ta' schwannomatosis fuq il-benessri konjittiv, psikoloġiku, emozzjonali u soċjali tal-pazjenti. Distress psikoloġiku jista' jkun ikkawżat minn uġiġħ, għejja, li jkollhom jgħaddu minn diversi interventi kirurġiči, incertezza dwar il-progressjoni tal-mard, u biżgħat relatati mal-ippjanar tal-familja. It-twemmin tal-pazjenti dwar il-kundizzjoni medika tagħhom jista' jkun determinanti estremament qawwija fir-rispons tagħhom għat-terapija, il-ġestjoni fit-tul u dd-iżabilità generali. Is-severità tal-mard fiziċi mhux dejjem tkun ikkorrelata ma 'dwejjaq emozzjonali, madankollu l-uġiġħ huwa fattur sinifikanti fl-schwannomatosis. Dan mhux sorprendenti peress li l-uġiġħ għandu korrelazzjoni psikosoċjali sinifikanti u rikonoxxuta sew.

Čaħda ta' responsabbiltà: Il-kontenut ta' dan is-sommarju huwa bbażat fuq il-ERN GENTURIS CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS, TREATMENT, MANAGEMENT AND SURVEILLANCE OF PEOPLE WITH SCHWANNOMATOSIS Version 8.3 (22.07.2021)

B'mod realistiku, valutazzjoni psikoloġika formali ma tistax titwettaq fil-pazjenti kollha dijanostikati bi schwannomatosis. Madankollu, certi fatturi ta' riskju għandhom javżaw lill-klinċista biex jikkunsidra l-involvement u r-riferiment psikoloġiku bikri. Realistically, a formal psychological assessment cannot be performed in all patients diagnosed with schwannomatosis. However, certain risk factors should alert the clinician to consider early psychological involvement and referral.