

Protocolo de seguimiento en la schwannomatosis

	Examen o vigilancia	Intervalo	Edad de inicio	Fuerza de la recomendación*
Schwannomatosis	Exploración clínica, valoración del dolor y exploración neurológica	Anual	12-14 años	Moderada
Schwannomas	Resonancia magnética de cerebro y columna	Recomendaciones específicas según gen y edad	Diagnóstico o 12-14 años	Fuerte
	RM de cuerpo entero	Basal o poco después del diagnóstico. Considere alternarla con RM Craneoespinal-	Diagnóstico o 12-14 años	Moderada
	Ecografía	Considerarla para resolver dudas en lesiones en extremidades o intercostales.	Según sea apropiado	Moderada

* Esta clasificación se basa en artículos publicados y consenso de expertos: fuerte: consenso de expertos Y evidencia consistente; moderada: consenso de expertos CON evidencia inconsistente Y/O nueva evidencia que probablemente respalde la recomendación; débil: decisión de la mayoría de expertos SIN evidencia consistente

Protocolo de seguimiento en la schwannomatosis

Esta guía se ha elaborado a partir de la mejor evidencia disponible y el consenso de expertos en esta área y se actualizará periódicamente para reflejar los cambios en la evidencia.

Es esperable que los médicos sigan esta guía, a menos que exista una razón clínica convincente específica para un paciente individual que indique un seguimiento diferente.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu