

ERN GENTURIS kopsavilkums vienkāršā valodā:

Vēža novērošanas vadlīnijas personām ar PTEN hamartomas audzēja sindromu (PHTS)

IEVADS

PTEN hamartomas audzēja sindromu (PHTS) izraisa izmaiņas PTEN (fosfatāzes un tenzīna homologa) gēnā. PHTS palielina krūts, vairogdziedzera, endometrija, nieru un kolorektālā vēža risku. PHTS ir reta saslimšana, un tā diagnoze balstās uz ģenētisko testēšanu. Novērošana tiek uzskatīta par galveno, lai atklātu agrīnas vēža formas un spētu ārstēt cilvēkus.

VADLĪNIJAS MĒRĶI

PTEN hamartomas audzēja sindroma (PHTS) vadlīnijas ir izveidotas, lai palīdzētu veselības aprūpes speciālistiem nodrošināt visjaunāko uzraudzību personām ar PHTS. Šīs vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem pierādījumiem un ekspertu pieredzi par cilvēku ar PHTS aprūpi, un tās regulāri tiek atjauninātas, lai atspoguļotu pierādījumu izmaiņas. Paredzams, ka klīnicisti ievēros šīs vadlīnijas, ja vien konkrētam pacientam nav pārliecinošu klīnisku iemeslu, lai to nedarītu.

VADLĪNIJAS DARBĪBAS JOMA UN MĒRĶIS

Vadlīnijas ir paredzētas vēža novērošanai personām ar PHTS. Katram vēža veidam vadlīnijās ir norādīts, kādi izmeklējumi ir jāveic novērošanai, kādā vecumā sākt uzraudzību un cik bieži izmeklēšanu veikt.

GALVENIE IETEIKUMI

| | Kāds izmeklējums | Cik bieži | Sākot no plkst |
|-----------------------|--|---|----------------|
| Vairogdziedzera vēzis | Ultrasonogrāfija | Katru gadu | 18 gadi |
| Krūts vēzis | Mammogrāfija | Katru gadu Ik pēc 2 gadiem | 30 gadi |
| Nieru vēzis | Ultrasonogrāfija | Ik pēc 2 gadiem | 40 gadi |
| Endometrija vēzis | Nav ieteicams | *ja skrīnings, tad: ultrasonogrāfija 1 reizi gadā | (40)* |
| Kolorektālais vēzis | Ievērojiet vispārējās populācijas skrīninga vadlīnijas | - | - |

Papildus iepriekš uzskaitītajām pārbaudēm vadlīnijās ir ieteikts skartajām sievietēm piedāvāt risku mazinošu krūšu operāciju.

Atruna: šī kopsavilkuma saturs ir balstīts uz "GENTURIS Cancer surveillance guideline for individuals with PTEN Version 14 (05.09.2019)".