

Švannomatozės priežiūros protokolas

	Ištyrimas/patikra	Intervalas	Amžius pradėti	Stiprumas*
Švannomatozė	Klinikinis skausmo tyrimas ir įvertinimas bei neurologinis tyrimas	Metinis	12-14 metų	Vidutinis
Švanomos	Smegenų ir stuburo MRT	Pagal specifines genų/amžiaus rekomendacijas	Diagnozė arba 12-14 m	Stiprus
	Viso kūno MRT	Pradinis ištyrimas arba netrukus po jo. Apsvarstykite galimybę kaitalioti su kaukolės ir nugaros smegenų	Diagnozė arba 12-14 m	Vidutinis
	Ultragarsas (echoskopija)	Apsvarstykite galimybę išspręsti galūnių ar tarpšonkaulinių problemų	Kaip pridera	Vidutinis

* Šis įvertinimas pagrįstas publikuotais straipsniais ir ekspertų sutarimu: stiprus – ekspertų sutarimas IR nuoseklūs įrodymai, vidutinis – ekspertų sutarimas SU nenuosekliais įrodymais IR (ARBA) naujais įrodymais, galinčiais paremti rekomendaciją, silpnas – ekspertų daugumos sprendimas BE nuoseklių įrodymų.

Švanomatozės priežiūros protokolas

Šios gairės buvo parengtos remiantis geriausiais turimais įrodymais ir šios srities ekspertų sutarimu ir yra reguliariai atnaujinamos, kad atspindėtų įrodymų pokyčius.

Tikimasi, kad gydytojai laikysis šių gairių, nebent konkrečiam pacientui yra įtikinamų klinikinį priešasčių jų nesilaikyti.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu