

## Kontrollprogram schwannomatosis

	Undersökning eller kontroller	Intervall	Startålder	Grad av evidens*
Schwannomatos	Klinisk undersökning Inklusive kartläggning av smärta och neurologisk undersökning	Årlig	12-14 år	Måttlig
Schwannomas	MR av hjärna och ryggrad	Enligt specifik gen / ålders rekommationer	Från diagnos eller 12-14 år	Stark
	Helkropps-MR	Baslinje eller strax efter. Överväg att alternera med kraniospinal-	Från diagnos eller 12-14 år	Måttlig
	Ultraljud	Kan övervägas som tillägg för extremiteter och interkostalt-	Vid behov	Måttlig

\* Den här evidensgraden baseras på publicerade artiklar och expertkonsensus: stark – expertkonsensus OCH överrensstämmande bevis, måttlig – expertkonsensus MED ojämna bevis OCH/ELLER nya bevis som sannolikt stöder rekommationen, svaga – expertmajoritetsbeslut UTAN överrensstämmande bevis

# Kontrollprogram

schwannomatosis

Dessa rekommendationer är baserade på bästa tillgängliga evidens och utgör ett konsensus från experter inom området. De uppdateras regelbundet och anpassas på så sätt till nya data och evidens.

Vår förhoppning är att läkare kommer att rekommendera patienter kontroller i enighet med dessa riktlinjer, såvida specifika kliniska skäl inte föreligger.



**European  
Reference  
Network**

for rare or low prevalence  
complex diseases



Genetic Tumour Risk  
Syndromes (ERN GENTURIS)



[www.genturis.eu](http://www.genturis.eu)