

Overvågningsprotokol schwannomatose

	Undersøgelse eller overvågning	Interval	Alder ved opstart af overvågning start	Videnskabelig styrke*
Schwannomatose	Klinisk undersøgelse og vurdering af smerter og neurologisk undersøgelse	Årligt	12-14 år	Moderat
Schwannomer	MR af hjerne og neuroaksen	I henhold til det specifikke gen-/aldersanbefalinger	Diagnose eller 12-14 år	Stærk
	MR af hele kroppen	Baseline eller kort efter. Overvej at veksle med kraniospinal-	Diagnose eller 12-14 år	Moderat
	Ultralyd	Kan overvejes ved ekstremitets affektion eller intercostal	Ved behov	Moderat

* Denne bedømmelse er baseret på publicerede artikler og ekspertkonsensus: stærk – ekspertkonsensus OG konsekvent evidens, moderat – ekspertkonsensus MED inkonsistent evidens OG/ELLER ny evidens, der sandsynligvis understøtter anbefalingen, svag – ekspertflertalsbeslutning UDEN konsistente beviser

Overvågningsprotokol

schwannomatose

Denne retningslinje er udarbejdet ud fra den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation og konsensus blandt førende eksperter på dette område. Retningslinjen opdateres løbende i henhold til ny viden.

Forventningen er, at klinikere vil følge denne retningslinje, medmindre der er tvungende kliniske årsager til afvigelse ved håndtering af en patient.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu