

Švannomatoosi diagnoosiga patsiendi jälgimise juhend

	Läbivaatus või jälgimine	Intervall	Alustamise vanus	Tõenduspõhisus*
Švannomatoos	Kliiniline läbivaatus ja valu hindamine ning neuroloogiline uuring	Iga-aastane	12-14 eluaastat	Mõõdukas
Švannoom	Aju ja selgroo MRI	Vastavalt konkreetsetele geeni/vanuse soovitudele	Diagnoosil või 12-14 eluaastat	Tugev
	Kogu keha MRI	Diagnoosi järgselt baastaseme määramiseks. Kaaluge vaheldumisi kraniospinaal MRIga-	Diagnoosil või 12-14 eluaastat	Mõõdukas
	Ultraheli	Kaaluge vajadust jäsemete või interkostaalsete probleemide lahendamisel	Vastavalt vajadusele	Mõõdukas

* See hinnang põhineb avaldatud artiklidel ja ekspertide konsensusel: tugev – ekspertide konsensus JA järjekindlad tõendid, mõõdukas – ekspertide konsensus, KOOS ebajärjekindlate tõenditega JA/VÕI uute tõenditega, mis tõenäoliselt toetavad soovitusi, nõrk – ekspertide enamuse otsus ILMA järjekindlate tõenditeta.

Švannomatoosi diagnoosiga patsiendi jälgimise juhend

Antud juhend on koostatud parimate olemasolevate tõendite ja selle valdkonna ekspertide konsensuse põhjal ning seda ajakohastatakse regulaarselt, et kajastada kirjanduses toimunud muutusi.

Eeldatakse, et arstid järgivad seda juhendit, välja arvatud juhul, kui konkreetse patsiendi puhul on mõjuv kliiniline põhjus seda mitte teha.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu